

妇科

恶性肿瘤患者健康管理  
---宫颈癌

四川大学华西第二医院 尹亚楠



CONTENT

# 目录

01

妇科恶性肿瘤疾病概述

02

宫颈癌的健康管理

03


子宫内膜癌的健康管理

04

卵巢癌的健康管理


05

外阴癌的健康管理




## 妇科恶性肿瘤疾病概述

## 恶性肿瘤概述




**宫颈癌**

最常见的妇科恶性肿瘤




**子宫内膜癌**

生殖道三大恶性肿瘤之一



**卵巢癌**


死亡率最高的妇科肿瘤



**外阴癌**

发病率为恶性肿瘤的3%-5%

# 恶性肿瘤概述



# 恶性肿瘤概述



问题1

妇科常见恶性肿瘤的类型



问题2

妇科恶性肿瘤病人的病因



问题3

妇科恶性肿瘤病人的治疗

# 宫颈癌



我国每年新增病例约13.5万，  
占全球发病总数的1/3

高发年龄为50-55岁，近年  
来发病有年轻化的趋势

宫颈癌以鳞状细胞癌为主

错

01

宫颈那么小，

得癌的几率很低吧？

宫颈癌是  
仅次于乳腺癌的  
发病率最高的  
妇科癌症



在中国农村，  
宫颈癌是第十位的死亡病因

# 全球每年超过<sup>剧增</sup>20万 女性死于宫颈癌.....

有哪些明星死于宫颈癌？



**梅艳芳**  
死于宫颈癌  
年仅40岁



**李媛媛**  
死于宫颈癌  
年仅41岁



**杰德·古迪**  
死于宫颈癌  
年仅28岁



**宋汶霏**  
死于宫颈癌  
年仅27岁



# HPV感染途径



性行为（主要）




接触不洁净的卫生  
洁具



接触已污染的卫  
生用品

# HPV病毒



宫颈癌大多由高危型HPV感染导致



最常见的HPV高危亚型为16和18



高危型HPV持续、高负荷地接触



HPV疫苗可降低宫颈癌发病率

# 宫颈癌

## 临床表现


### 症状:

- 1.接触性阴道流血
- 2.阴道排液，白色或血性，有腥臭
- 3.尿频尿急、便秘、疼痛、肾积水、贫血、恶病质等

## 体征

### 体征:

- 外生型可见菜花状赘生物，质脆易出血；
- 内生型表现为宫颈肥大，质硬，颈管膨大



# 宫颈癌

## 手术治疗

主要用于早期病人，优点是年轻病人可保留卵巢及阴道功能

## 放射治疗

适用于晚期或无法手术的病人

## 化学治疗

改善病人生存期，使宫颈癌复发危险度下降40%-60%



## 宫颈癌的发病过程



正常



癌症早期



癌症晚期

## 宫颈癌预防



1. 普及防癌知识，开展性卫生教育，提倡晚婚少育；
2. 重视高危因素和高危人群，有异常症状及时就医；
3. 积极治疗性传播疾病；
4. 开展宫颈癌普查普治；
5. 注射HPV疫苗。

## 宫颈癌预防



宫颈薄层液基细胞学检查 (TCT)



非典型鳞状细胞 (ASCUS)

# 宫颈癌预防

0787782200 0787782200

**厦门市妇幼保健院产前诊断实验室**

HPV基因芯片诊断结果报告单 门诊

姓名:  病员号: 447520055 送检医生: 吴冬梅 标本: 宫颈分泌物

性别: 女 样本编号: 20160713G0252878 科别: 妇保科 备注:

年龄: 34岁 床号: 临床诊断: 阴道炎

No	项	日	结果	参考区间	No	项	日	结果	参考区间
HPV高危型:					HPV低危型:				
1	HPV16		阴性	阴性	12	HPV58		阴性	阴性
2	HPV18		阴性	阴性	13	HPV59		阴性	阴性
3	HPV31		阴性	阴性	14	HPV66		阴性	阴性
4	HPV33		阴性	阴性	15	HPV68		阴性	阴性
5	HPV35		阴性	阴性	16	HPV6		阴性	阴性
6	HPV39		阴性	阴性	17	HPV11		阴性	阴性
7	HPV45		阴性	阴性	18	HPV42		阴性	阴性
8	HPV51		阴性	阴性	19	HPV43		阴性	阴性
9	HPV52		阴性	阴性	20	HPV44		阴性	阴性
10	HPV53		阴性	阴性	21	HPVCP8304		阴性	阴性
11	HPV56		阴性	阴性					

**检测说明:**


1. 本检测可排除常见的15种高危型及6种低危型人乳头状瘤病毒 (HPV) 感染类型, 但不排除检测全阴性结果者感染其它HPV型的可能性。
2. 高危型HPV感染是宫颈癌发生的必要条件之一, 临床上应予以重视, 但感染高危型HPV并非即是病变发生, 需进一步检查确认。
3. 低危型HPV感染者建议跟踪检查, 检测全阴性结果者建议定期复查。注: 此分析结果只对本次样本负责, 并仅供临床医生参考。

检验日期: 2016-07-13 打印日期: 2016-7-20 检验者: 夏众敏 审核者: 邵志伟

地址: 厦门市镇海路10号, 邮编: 361003, 电话: 0591-2663631

## HPV检测报告单

## 宫颈癌预防



杂交捕获人乳头瘤病毒检查 (HC2)  HPV病毒的具体数值 (最先进)


病例报告有癌  
前病变症状！



你真幸运，在癌症  
早期就发现了。

幸好做了检查，否  
则后果不堪设想。





谢谢!