

宝宝发烧，美林和泰诺林怎么用？

药学部 吕娟



季节交替、冷暖变换，宝宝最容易发生感冒发热，宝宝一发热，妈妈就惊慌，退烧药自然是大多数家庭常备药的品种之一。

在我们平时的工作中，常常遇到宝妈们来咨询：

宝宝发热，家里的美林和泰诺林该怎么喂？

两种药物有什么区别？应该注意哪些问题？

今天，我们就针对美林和泰诺林给各位家长做个简单介绍，让宝妈们更了解美林和泰诺林的使用。

宝宝发热，妈妈不慌，

正确用药，护宝健康。

美林和泰诺林的对比

商品名	美林	泰诺林
通用名	布洛芬混悬剂滴	对乙酰氨基酚混悬滴剂
药品图片		
主要成分	布洛芬	对乙酰氨基酚
性状	混悬液	混悬液
适应症	婴幼儿退热 轻度头痛、咽痛、牙痛等。	发热 轻度至中度疼痛如头痛、关节痛、牙痛等

适用年龄	6 月以下，应遵医嘱	1 岁以下，应遵医嘱
规格	15ml: 0.6g	15ml: 1.5g
用法用量	6-11 月 5.5-8.0kg 1 滴管 (1.25ml) 12-23 月 8.1-12.0kg 1.5 滴管 (1.875ml) 2-3 岁 12.1-15.9kg 2 滴管 (2.5ml)	1-3 岁 10-15kg 1-1.5ml 4-6 岁 16-21kg 1.5-2ml 7-9 岁 22-27kg 2-3ml 10-12 岁 28-32kg 3-3.5ml
	若持续高热，每 6-8 小时可重复使用一次，每 24 小时不超过 4 次。	若持续发热或疼痛，可间隔 4-6 小时重复用药一次，24 小时不超过 4 次。
不良反应	耐受性良好，副作用低，一般为轻度胃、肠不适。	偶见皮疹、荨麻疹。
注意事项	连续用药三天以上，发热或疼痛仍未缓解需及时就医。	用于解热连续使用不超过 3 天，用于止痛不超过 5 天，症状未缓解需及时就医。

特别注意：不推荐对乙酰氨基酚联合布洛芬用于儿童退热，也不推荐对乙酰氨基酚与布洛芬交替用于儿童退热降温（交替使用降温效果优于单一使用，但不能改善儿童舒适度）。

