

周四上午的眼底筛查是个啥



儿科门诊

四川大学



新生儿常见眼病

先天 发育 异常

新生 儿眼 炎



早儿网膜病

先天 性白 内障 视网 膜出

四川大学




早产儿视网膜病变 (ROP)

- •全球范围内儿童致盲的主要原因
- •目前防治该病的根本方法是通过对

高危早产儿进行常规筛查,并对发

现的早期病变及时进行治疗。



四川大学



- •2003 年美国儿科学会明确强调眼部检查应 在新生儿期就开始
- •2004年卫生部颁布了中华医学会制定的《早产儿治疗用氧和视网膜病变防治指南》
- •2014年进行更新



四川大学



筛查标准



- •出生体重<2000g,或出生孕周<32w的早产儿和低体重儿
- ·患有严重疾病或有明确较长时间吸氧史, 儿科医生认为比较高危的患者可适当扩大 筛查范围

四川大学



筛查注意事项



检查前1小时

检查后30分钟


四川大学



筛查注意事项

如有药物过敏, 请告知医护人员





散瞳前后眼睛对比图

总共滴3次,每间隔5分钟滴一次,第三次滴药后休息30分钟,待瞳孔放大后再进行检查

四川大学



筛查注意事项





患儿会有哭闹现象,家长 按要求固定好患儿,检查 结束少数患儿有结膜出血, 不必担心,这种现象会在 短时间内退去。

四川大学



终止检查的条件


满足以下条件之一即可终止随诊:

(1)视网膜血管化

(2)矫正胎龄45周,无阈值前病变或阈值病变,

视网膜血管已发育到III区

(3)视网膜病变退行。



四川大学



谢谢聆听



四川大学