

异位妊娠

主讲人： 雷雅雯、刘湔
2019.10.30



West China
Second University Hospital



异位妊娠



概述



病因病理



临床表现



治疗原则



护理




West China
Second University Hospital

异位妊娠-概述

正常妊娠时，受精卵着床于子宫体腔内膜。受精卵在子**宫体腔外**着床发育时，称为**异位妊娠**，包括输卵管妊娠、卵巢妊娠、腹腔妊娠、宫颈妊娠及阔韧带妊娠等。

异位妊娠：嘿，受精卵，你跑岔了！

正常情况



正常情况下，受精卵会由输卵管迁移到子宫腔，然后安家落户，慢慢发育成胎儿。

异位妊娠

90%以上的宫外孕发生在输卵管




由于种种原因，受精卵在迁移的过程中出了岔子，没有到达子宫，而是在别的地方停留下来，这就成了宫外孕，医学术语又叫**异位妊娠**。



Second University Hospital

输卵管妊娠

输卵管妊娠是妇产科常见急腹症之一，因其发生部位不同可分为间质部、峡部、壶腹部和伞部，当输卵管妊娠流产或破裂时，可引起腹腔内严重出血如不及时诊断、处理，可危及生命。（以**壶腹部妊娠**多见，约占78%）。



①壶腹部妊娠 ②峡部妊娠
③伞部妊娠 ④间质部妊娠



West China
Second University Hospital

输卵管妊娠-病因

- **1.输卵管炎症** 包括输卵管粘膜炎和输卵管周围炎，这是输卵管妊娠的主要原因。
- **2.输卵管发育不良或功能异常** 输卵管过长、肌层发育差、黏膜纤毛缺乏等。
- **3.受精卵游走**
- **4.辅助生殖技术**
- **5.其他**



输卵管妊娠-病理

- **1.输卵管妊娠流产** 多见于输卵管壶腹部妊娠，发病多在妊娠8-12周
- **2.输卵管妊娠破裂** 多见于输卵管峡部妊娠，多见于妊娠6周左右
- **3.陈旧性异位妊娠** 发生于输卵管妊娠流产或破裂后未及时治疗
- **4.继发性腹腔妊娠** 发生于输卵管妊娠流产或破裂后胚胎被排入腹腔
- **5.持续性异位妊娠** 近年来输卵管保守治疗较多，若术中未完全清除妊娠物而继续生长，致术后 β -HCG不下降或反而上升，称为持续性异位妊娠



输卵管妊娠-临床表现

1. **停经** 多数病人停经6-8周以后出现不规则阴道出血
2. **腹痛** 是输卵管妊娠病人就诊的主要症状。
3. **阴道流血** 胚胎死亡后导致血hCG下降，卵巢黄体分泌的激素不能维持蜕膜生长而发生剥离出血。
4. **晕厥与休克** 由于腹腔内急性出血及剧烈腹痛，轻者出现晕厥，严重者出现失血性休克。
5. **腹部包块**



West China
Second University Hospital

输卵管妊娠-治疗原则

以**手术治疗为主**，其次是药物治疗

1.手术治疗 应在积极纠正休克的同时，进行手术抢救，根据情况行腹腔镜下患侧输卵管切除术或保留患侧输卵管及其功能的保守性手术。

2.药物治疗 根据中医辨证论治方法，合理运用中药，或用中西医结合的方法进行异位妊娠的保守治疗。治疗机制是抑制滋养细胞增长、破坏绒毛，使胚胎组织坏死、脱落、吸收。



West China
Second University Hospital

护理评估

1.健康史: 月经史(准确推断停经时间), 注意将阴道不规则流血和月经过期几天相互区别

2.身心状况 输卵管妊娠未发生流产或破裂时症状不明显; 输卵管妊娠流产或破裂者, 下腹部有明显压痛和反跳痛, 尤以患侧为甚, 患者腹腔内出血较多时呈贫血貌, 严重者呈休克症状。



West China
Second University Hospital

护理评估

3.相关检查

- ①**阴道后穹隆穿刺** 简单可靠的诊断方法、适用于腹腔内出血病人（抽出暗红色不凝血）
- ②**妊娠试验**：放射免疫法测血中hCG，尤其是动态观察血 β -hCG的变化对诊断异位妊娠极为重要。
- ③**超声检查**（有助于诊断异位妊娠、准确性高）
- ④**腹腔镜检查**
- ⑤**子宫内膜病理检查**



West China
Second University Hospital

输卵管妊娠-护理诊断

急性疼痛 与出血有关

潜在并发症 出血性休克

有感染的危险 与出血导致的机体抵抗力下降有关

恐惧 与担心手术失败有关



West China
Second University Hospital

输卵管妊娠-护理目标

- 1.病人休克症状得以及时发现并缓解
- 2.病人能以正常心态接受此次妊娠失败的现实。



West China
Second University Hospital

输卵管妊娠-护理措施

1. 接受手术治疗病人的护理
2. 接受非手术治疗病人的护理
3. 健康教育



West China
Second University Hospital

手术治疗的护理

1.积极做好术前准备

严密监测病人生命体征，配合医师积极纠正病人体克症状(**开放静脉通道**，做好输血输液的准备，**补充血容量**)，按急诊手术要求做好术前准备。

2.提供心理支持

保持周围环境安静、有序，减少和消除病人的紧张、恐惧心理协助病人接受手术治疗方案。



West China
Second University Hospital

非手术治疗的护理

1.严密观察病情

密切观察病人的一般情况、**生命体征**，重视病人的主诉，尤其注意阴道流血量与腹腔内出血量不成正比，告知病人病情发展的一些指征(如出血增多、腹痛加剧、肛门坠胀感明显)。

2.加强化学药物治疗的护理

常用药物为甲氨蝶呤。**应用B超和 β -HCG进行严密监护**，并注意病人的病情变化及药物毒副反应（常表现为消化道反应，骨髓抑制以白细胞下降为主，有时可出现轻微肝功能异常，大部分反应是可逆的）。



West China
Second University Hospital

非手术治疗的护理

3.指导病人体息与饮食

病人应卧床休息，避免腹部压力增大。卧床期间，护士需提供相应的生活护理。指导病人摄取足够的营养物质，尤其是富含铁蛋白的食物，以促进血红蛋白的增加，增强病人的抵抗力。

4.监测治疗效果

协助正确留取血标本，以监测治疗效果



West China
Second University Hospital

健康教育

- 1.教育病人保持良好的卫生习惯，勤洗浴、勤换衣、性伴侣稳定。
- 2.发生盆腔炎后需立即彻底治疗，以免延误病情
- 3.由于输卵管妊娠者中有再发生率和不孕率，因此护士需告知病人，下次妊娠时要及时就医，并且不宜轻易终止妊娠



West China
Second University Hospital

【例题1】 以下哪个症状是输卵管妊娠病人就诊的主要症状 B

- A. 停经
- B. 腹痛
- C. 阴道流血
- D. 晕厥与休克
- E. 腹部包块



West China
Second University Hospital

【例题2】输卵管妊娠中最常见的部位是 C

- A. 间质部
- B. 峡部
- C. 壶腹部
- D. 伞部



West China
Second University Hospital

参考资料：妇产科学第六版教材



West China
Second University Hospital

THANK YOU



West China
Second University Hospital